

鹿慢性消耗病（CWD）（概要）

ファクトシート

《作成日：平成29年10月24日》

《最終更新日：令和元年11月12日》

1. 鹿慢性消耗病（CWD）とは

鹿慢性消耗病（Chronic Wasting Disease: CWD）は、シカ科の動物が罹患する伝達性海綿状脳症（Transmissible Spongiform Encephalopathy: TSE）であり、アメリカアカシカ（*Cervus canadensis*）、アカシカ（*Cervus elaphus*）、ミュールジカ（*Odocoileus hemionus*）、オグロジカ（*Odocoileus hemionus*）、オジロジカ（*Odocoileus virginianus*）、ニホンジカ（*Cervus nippon*）、ヘラジカ（*Alces alces*）及びトナカイ（*Rangifer tarandus*）が感受性動物であることが知られている^{1,2)}。これまでに日本における発生は確認されていない（2019年10月末現在）。また、食品を介した経路も含めて、病原体であるCWDプリオンが、人へ感染することを示す証拠はこれまでに確認されていない。一方、近年、諸外国ではCWDのシカ科動物間における感染拡大が報告されている。これらのことを踏まえ、査読を受けた科学論文として報告されている知見を整理し、本ファクトシートとして取りまとめた。

2. 発生状況

CWDは、米国、カナダ、韓国、ノルウェー、フィンランド及びスウェーデンにおいて発生が確認されている。

1967年、米国コロラド州の野生動物研究施設で捕獲・飼養されていたミュールジカ（以下、「MD」と言う。）で、原因不明の消耗性疾患として初めて報告され、1978年にTSEであることが明らかにされた。米国では、1997年に野生動物のサーベイランスを開始し、これまでに、野生・飼育下合わせて26州*において発生が確認されている（図1）^{1,3,4,5)}。

カナダでは、1996年にサスカチュワン州の農場において初めて報告され、以降、アルバータ州、サスカチュワン州及びケベック州で発生が確認されている（図1）^{3,6)}。カナダへは、米国サウスダコタ州から輸入された個体から侵入したと考えられている⁷⁾。

韓国では、2001年に忠清北道の農場において、1997年にカナダサシュカチュワン州から輸入されたアメリカアカシカ（以下、「Elk」と言う。）で初めて報告され、以降、7道において発生が確認されている（図2）^{8,9,10)}。

ノルウェーでは、2016年に野生のトナカイで初めて報告され、以降、4地域においてトナカイ、ヘラジカ及びアカシカでの発生が確認されている（図3）^{2,11)}。トナカイで確認されたものとヘラジカ及びアカシカで確認されたものは特徴が異なることが示唆されている¹²⁾。

フィンランド及びスウェーデンでは、2018年及び2019年に、ヘラジカでCWD症例が

* アーカンソー州、コロラド州、イリノイ州、アイオワ州、カンザス州、メリーランド州、ミシガン州、ミネソタ州、ミシSSIPPI州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、ペンシルバニア州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バージニア州、ウェストバージニア州、ウィスコンシン州、ワイオミング州

報告された（図3）^{13,14}。これらの症例は、ノルウェーのヘラジカで確認されたものと類似しているとされている^{12,13,14}。

日本では、家畜伝染病予防法（昭和26年5月31日法律第166号）により、伝達性海綿状脳症（TSE）として家畜伝染病に指定されている。また、2003年6月から、「伝達性海綿状脳症（TSE）検査対応マニュアル」に基づき、家畜のシカがサーベイランスの対象とされている¹⁵。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所（現 動物衛生研究部門）は、2003年から2010年にかけて野生のシカを対象にサーベイランスを実施した^{16,17}。さらに、農林水産省は野生動物監視体制整備事業において平成30年度にサーベイランスを実施した¹⁸。2019年10月末現在、日本での発生は確認されていない。

3. CWDの病態、診断及び感染経路

感染動物は、数年の潜伏期間の後、進行性に消瘦、衰弱、流涎等の症状を呈し、3～4か月で死に至る。脳の病理学的検査による空胞変性の確認、免疫組織化学検査、酵素免疫測定法（ELISA）、ウエスタンブロット法による脳内又はリンパ節に蓄積した異常プリオンたん白質（PrP^{Sc}）の検出による診断が可能であり、また、現行のBSE検査がCWDの診断・サーベイランスにも応用可能とされている^{16,17}。

PrP^{Sc}は、主に脳、脊髄、扁桃、リンパ節、脾臓等に蓄積するが、心筋や骨格筋に蓄積が認められたとの報告もある^{19,20,21}。また、牛海綿状脳症（BSE）とは異なり、血液、唾液、尿及び糞中からも感染性が確認されており、直接又は間接接触によるシカからシカへの水平感染が生じることが示唆されている^{20,22,23}。




図1 米国・カナダにおける発生状況⁴⁾




図2 韓国における発生状況

(韓国動物防疫統合システム¹⁰⁾の情報に基づき作成)




図3 北欧における発生状況

(ノルウェー国立獣医学研究所 (NVI)¹¹⁾、フィンランド食品局¹³⁾及びスウェーデン国立獣医学研究所 (SVA)¹⁴⁾の情報に基づき作成)

4. 人に対する影響

査読を受けた科学論文として報告されている CWD プリオンの人に対する影響に関する研究結果の概要を以下にまとめた。

- ・ CWD プリオンが人のプリオン病の原因となったことを示す疫学的な知見はない。
- ・サルへの投与実験では、リスザル (*Saimiri sciureus*) が CWD プリオンに対して高い感受性を示す一方、カニクイザル (*Macaca fascicularis*) に対しては、高い種間バリアの存在が示唆されている。また、人のプリオンたん白質 (PrP) を発現するトランスジェニックマウスへの投与実験においても、高い種間バリアの存在が示唆されている。
- ・牛が CWD プリオンに経口で感染しにくいことが疫学的及び実験的に示唆されており、また、脳内接種により CWD に感染した牛の脳をサルに経口投与した結果、現時点で感染は確認されていない。

詳細は以下のとおりである。

(1) 疫学的知見

米国疾病予防管理センター (CDC)、Belays ら及び Anderson らは、CWD との関連が疑われた米国のクロイツフェルト・ヤコブ病 (Creutzfeldt-Jakob disease: CJD) 患者 12 症例について、CWD 流行地域の鹿肉へのばく露状況等を調査したが、CWD プリオンが人間に伝達したことを強く示す証拠は得られなかった^{24,25,26,27)}。1979 年から 2000 年の間のデータに基づく、米国の CWD 流行地域であるコロラド州及びワイオミング州における CJD の年齢調整死亡率[†]は、それぞれ 1.2/100 万人及び 0.8/100 万人と、米国内のその他の地域と同様であった。また、55 歳未満で死亡した CJD 患者の割合は、コロラド州で全体の 13.4%であり、国全体の 10.2%と大きく変わらず、ワイオミング州では 22 年間のサーベイランスで CJD 患者は 1 例も確認されなかった。著者は、これらのことは、CWD プリオンのヒトへの伝達のリスクが、あったとしても低いことを示唆するとしている²⁶⁾。

Anderson らは、CWD に感染したシカや Elk の組織検体を扱う研究所に勤務していた女性が記憶障害等を示したことから、診断を行った結果、CJD ではなくアルツハイマー病であったと報告している²⁷⁾。

Mawhinney らは、米国コロラド州内の CWD 流行郡と非流行郡における CJD 又は神経変性疾患 (55 歳より高齢のアルツハイマーを除く) で死亡する相対リスク及び州内の 1979-1998 年と 1999-2001 年における当該相対リスクを調べた結果、両郡で統計学的に有意な差はなかったとしている²⁸⁾。

Garruto ら及び Olszowy らは、2005 年にニューヨーク州で開催されたイベントで、CWD 感染鹿の肉を食した人々 81 名を対象に毎年アンケート調査を行った結果、2005 年から 2011 年にかけて、健康状態の有意な変化はなかったとしている^{29,30)}。

[†] 観察集団と基準集団の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率

(2) ヒトモデル動物への投与実験

①サルへの投与実験

Marsh らは、CWD 感染 MD の脳組織 40 mg 相当を 2 頭のリスザルへ脳内接種する実験を行った。その結果、2 頭中 2 頭に感染が認められた³¹⁾。

Race らは、CWD 感染 MD、Elk 又はオジロジカ（以下、「WTD」と言う。）の脳組織 2 mg 又は 20 mg 相当を 13 頭のリスザルへ脳内接種、及び脳組織 600 mg 相当を 12 頭のリスザルへ経口投与する実験を行った。その結果、それぞれ 13 頭中 13 頭及び 12 頭中 11 頭に感染が認められた。さらに、Race らは、同脳組織 5 mg 相当を 6 頭のカニクイザルへ脳内接種、及び脳組織 800 mg 相当を 8 頭のカニクイザルへ経口投与する実験を行った。その結果、いずれのカニクイザルにも感染は認められなかった。リスザルとカニクイザルとの、CWD プリオンに対する感受性の違いについて著者は、「進化学的にはカニクイザルは人により近縁であり、人も CWD に対して耐性をもつだろう」と考察している^{32,33,34)}。

Comoy らは、1 頭のカニクイザルに対し、CWD 感染 WTD の脳組織 40 mg 相当を脳内に、脳組織 8 mg 相当を扁桃内に接種する実験を行った。その結果、当該サルは、接種後 87 か月時点で症状を示さず生存中とされている。また、2 頭のカニクイザルに対し、CWD 感染牛の脳組織 40 mg 相当を脳内に、脳組織 8 mg 相当を扁桃内に接種する実験を行った。その結果、2 頭のサルは、接種後 87 か月時点で症状を示さず生存中とされている（CWD の牛への感染性については、「5. ②牛への感染に関する知見」を参照）³⁵⁾。

②ヒト PrP 発現トランスジェニックマウスへの投与実験

Kong らは、CWD 感染 Elk の脳組織 0.3 mg 相当を、ヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量と同程度発現する 29 匹のトランスジェニックマウス（Tg40）又はヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量の約 2 倍発現する 22 匹のトランスジェニックマウス（Tg1）に脳内接種する実験を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった³⁶⁾。

Tamgüney らは、CWD 感染 Elk、MD 又は WTD の脳組織 0.3 mg 相当を、ヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量の約 2 倍発現するそれぞれ 39 匹、15 匹又は 13 匹のトランスジェニックマウス（Tg(HuPrP)440）に脳内接種する実験を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった³⁷⁾。

Sandberg らは、CWD 感染 MD の脳組織 0.3 mg 相当を、ヒト PrP（コドン 129V 型）を生理的な発現量の約 6 倍発現する 14 匹のトランスジェニックマウス（Tg152）、ヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量の約 4 倍発現する 13 匹のトランスジェニックマウス（Tg45）又はヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量の約 2 倍発現する 14 匹のトランスジェニックマウス（Tg35）に脳内接種する実験を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった³⁸⁾。

Wilson らは、CWD 感染 WTD の脳組織 2 mg 相当を、ヒト PrP（コドン 129M 型）を生理的な発現量と同程度発現する 24 匹のトランスジェニックマウス（HuMM）、ヒ

ト PrP (コドン 129M/V 型) を生理的な発現量と同程度発現する 24 匹のトランスジェニックマウス (HuMV) 又はヒト PrP (コドン 129V 型) を生理的な発現量と同程度発現する 24 匹のトランスジェニックマウス (HuVV) に脳内接種する実験を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった³⁹⁾。

Kurt らは、CWD 感染 Elk の脳組織に由来する 1-5%脳乳剤 20-30 μ L を、ヒト PrP (コドン 129M 型) を生理的な発現量と同程度発現する 12 匹のトランスジェニックマウス (Tg40) に脳内接種する実験を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった⁴⁰⁾。

Race らは、CWD 感染 Elk、MD 又は WTD の脳組織 0.3 mg 相当を、ヒト PrP (コドン 129M 型) を生理的な発現量の 8-16 倍発現する 13-20 匹のトランスジェニックマウス (Tg66) 又はヒト PrP (コドン 129M 型) を生理的な発現量の 2-4 倍発現する 13-20 匹のトランスジェニックマウス (TgRM) に脳内接種する実験を行った。その結果、IHC 及び WB では、いずれのマウスにも感染は認められなかった。一方、RT-QuIC (Real-time Quaking-induced Conversion) 法では、MD 又は WTD 脳組織を接種した Tg66 マウスそれぞれ 17 匹中 2 匹又は 15 匹中 2 匹で陽性が認められた。著者らは、本研究では解析手法として RT-QuIC 法を用いたこと及びヒト PrP の発現量が多いマウスを用いたことを挙げ、本研究で認められた低率の伝達は、種間バリアの存在を示唆するこれまでの研究と同様の結果であると考察している。また、この結果について、著者らは、偽陽性であった可能性及びマウスの脳内に接種したプリオンが検出された可能性もあるとしている⁴¹⁾。

5. その他の関連知見

① *in vitro*でのヒト PrP の変換

プリオンの感染性を検討するに当たり、*in vitro*での知見は、生体内でのより複雑な感染機序を省略化したものであり、実際の感染性を必ずしも反映するものではないが、PMCA (Protein Misfolding Cyclic Amplification) 法や RT-QuIC 法を用いた *in vitro* の反応系で、ヒト PrP が CWD プリオンによって変換されるといった現象が報告されている^{42,43)}。

② 牛への感染に関する知見

Gould らは、米国コロラド州の CWD 流行地域における成牛 262 頭(22 群から抽出)について、TSE への感染の有無を調査した。脳組織の病理所見及び IHC による確認の結果、TSE である証拠は確認できなかった。著者は、「統計学的な解析の結果、当該 22 群には TSE の感染牛はいない可能性が高いと結論できる」としている⁴⁴⁾。

Hamir ら及び Greenlee らは、CWD 感染 MD、WTD 又は Elk の脳組織 100 mg 相当を、牛に脳内接種する実験を行った。その結果、それぞれ 13 頭中 3 頭、14 頭中 12 頭又は 14 頭中 2 頭に感染が認められた^{45,46,47,48)}。

Williams らは、28 頭の CWD 感染 MD の脳組織に由来する脳乳剤 45 g を 12 頭の牛に経口投与し、10 年間の経過観察後、診断を行った。これらの牛の中枢神経組織及

びリンパ組織を対象に病理学的診断、IHC 及び WB を行った結果、別の疾病により観察期間中に死亡した 2 頭も含めて、いずれの牛にも異常プリオンたん白質の蓄積は認められなかった。

さらに別の実験として、それぞれ 12 頭（計 24 頭）の牛を、牛の頭数とほぼ同数の CWD 感染 MD 又は CWD 感染 Elk と同じ農場で飼料と水を共有させて飼育し、10 年間の経過観察後、上記と同様の診断を行った。その結果、別の疾病により観察期間中に死亡した 3 頭も含めて、いずれの牛にも異常プリオンたん白質の蓄積は認められなかった。なお、対照実験として、これらの牛と同じ農場で、CWD 清浄群で捕獲された 11 頭の MD 又は 18 頭の Elk を飼育したところ、全てが CWD に感染した。この結果から、著者らは、「経口投与又は長期間の汚染された環境へのばく露に伴う CWD の牛への伝達のリスクは低い」と結論した⁴⁹⁾。

参考. 各国機関による対応等

これまでに CWD の発生が確認されている国及びその周辺国における CWD プリオンの人へのリスクに関する対応等を以下にまとめた。詳細は以下のとおりである。

なお、日本においては、現時点では CWD の発生は確認されていない。農林水産省は、家畜防疫の観点から、CWD 発生国からのシカ科動物及びシカ科動物由来畜産物の輸入停止措置を講じている^{50,51,52,53,54})。また、厚生労働省は、関係事業者に対し、これらの国から輸入を行わないよう指導している^{55,56,57,58})。

1. 米国⁵⁾

米国疾病予防管理センター (CDC) は、2019 年 2 月に更新したウェブサイト上で、人への影響に関して、以下の見解を示している。

<伝達性について>

CWD は、実験的にリスザルやヒトの遺伝子を持ったマウスへ感染することが示されている。加えて、2009 年から始まったカナダとドイツの科学者による研究は、これまで CWD に感染することが示されている他のどの動物よりも遺伝的にヒトに近縁なサルである、マカク属のサルへの CWD の伝達の有無を評価している。2017 年 7 月 10 日、彼らは、研究経過の要約を報告した。そのなかで、彼らは、CWD に感染したシカ及び Elk の肉 (筋組織) 又は脳組織を給餌されたマカク属のサルに CWD が伝達することを示した。給餌した肉のなかには、無症状の CWD 感染シカ (健康に見え、症状を発現する前のシカなど) に由来するものもあった。これらの無症状のシカに由来する肉から、マカク属のサルの CWD への感染は可能であった。また、病原体を脳に直接接種されたマカク属のサルに対しても、CWD が感染可能であった。

この研究は、CWD がマカク属のサルへ伝達は成立しないとされたこれまでの研究とは、異なる結果を示した。異なる実験結果が生じた原因は不明である。これまでのところ、ヒトでの CWD の発生を示す確かな証拠はなく、ヒトが CWD プリオンに感染し得るかは不明である。一方、この研究は、CWD がヒトに対するリスクとなる可能性があるという懸念を生じさせ、ヒトの CWD へのばく露を防止することの重要性を示唆している。

CWD に感染している可能性のあるシカや Elk と接触するリスクが大きい人々について、何らかのプリオン病が高率に発生しているか否かを調査するための追加研究が進行中である。何らかの症状が現れるまでには長期間を要するため、仮にあったとして CWD の人へのリスクがどういったものかを解明するには、長年の研究を要すると、科学者らは予想している。

<予防について>

CWD がヒトにまん延しうるとすれば、シカや Elk の喫食に由来すると思われる。2006-2007 年に米国の居住者を対象に行われた CDC の調査によると、調査を受けた 20% 近くのヒトがシカや Elk を狩猟したことがあり、3 分の 2 以上のヒトがそれらの肉を食した経験があると答えた。しかし、これまでのところ、ヒトでの CWD の発生を示す確

かな証拠はなく、ヒトが CWD プリオンに感染し得るかは不明である。狩猟者は、CWD 発生地域で捕獲されたシカ及び Elk の肉を食すかどうかを決めるに当たって、受け入れることができるリスクの程度を含めて、多くのことを検討する必要がある。CWD 発生地域でシカ及び Elk を捕獲した狩猟者は、州の野生動物及び公衆衛生に関するガイダンスをチェックし、動物の検査が推奨又は義務付けられているかどうかを確認するべきである。CDC は、CWD の存在が確認されている地域においては、肉を食す前にこれらの動物の検査を検討することを推奨する。

CWD の検査は、いくつかの州の野生当局が、動物群における CWD の有病率を調べる目的で行うモニタリングツールである。検査は全ての州で実施されているものではなく、州ごとにこれらの検査の実施方法も異なる。検査結果が陰性であることは、その動物個体が CWD に感染していないことを保証するものではないが、CWD へのばく露リスクを大きく減少させる。

可能な限りの安全のために、そして潜在的な CWD へのばく露リスクを減少させるために、CWD 発生地域で狩猟を行う際には、狩猟者は以下のことを注意するべきである。

- 病気が疑われる、異常行動を示している、あるいは死亡している（轢死した）シカ及び Elk は、狩猟の対象としない、取り扱わない、肉を食さないこと。
- シカを解体する際は、
 - ・ラテックス製又はゴム製の手袋を着用すること。
 - ・動物の内臓（特に脳又は脊髄）の取扱いを最小限にすること。
 - ・家庭用ナイフやキッチン用品を使用しないこと。
- 州の野生動物及び公衆衛生に関するガイダンスをチェックし、動物の検査が推奨又は義務付けられているかどうかを確認すること。推奨事項は州ごとに異なるが、検査に関する情報は多くの州の野生局で得られる。
- シカや Elk の肉を食す前に、CWD の検査をよく検討すること。
- シカや Elk を商業的に加工する際には、多数の動物に由来する肉の交差を避けるため、個体ごとの加工の依頼を検討すること。
- CWD 検査陽性の動物に由来する肉は食しないこと。

米国農務省動植物検疫所は、商業的に飼養されているシカ及び Elk について規制を設けている。当局は、国家 CWD 群認定プログラムを実施している。自主的なプログラムとして、州及び飼養者は、群における CWD のリスクを減少させるための要件を満たしていることを確認している。群認定プログラムに参加していない群は、CWD のリスクが高い可能性がある。

2. カナダ⁶⁾

カナダ食品検査庁（CFIA）は、2007 年に公表し、2019 年 4 月に更新されたファクトシートで、人への影響に関して、以下の見解を示している。

現在のところ、シカや Elk での CWD の人への伝達を示す直接的な科学的証拠はない。しかし、予防的な措置として、CWD に感染したことがわかっている動物由来の組織は人の利用や消費に供しないことが推奨される。

人の CWD に汚染された可能性のある製品へのばく露を低減するため、国家又は州レベルで、感染動物のフードチェーンへの混入防止の措置が講じられている。

カナダ保健省は、TSE に感染したことがわかっている動物の肉の消費を避けることを推奨している。CWD の野生のシカ科動物での発生が確認されている地域では、狩猟者は、と体を扱う際は注意を払うことが推奨され、肉を食す、トロフィー[‡]を作製する又は製革する前には、その動物の検査を検討すべきである。その他の人の健康及び食品安全に関する問い合わせはカナダ保健省が受け付けている。

3. 韓国¹⁰⁾

韓国の動植物検疫所 (QIA) は、ウェブサイト上 (韓国農林畜産部動物防疫統合システム (KAHIS)) で、CWD の発生情報等を公表している。

4. ノルウェー

(1) ノルウェー食品安全科学委員会 (VKM)^{59,60,61)}

VKM は、2016 年 6 月、2017 年 3 月及び 9 月に公表した報告書 (Phase I・II 及び update statement) で、人への影響に関して、以下の見解を示している。

Phase I の結論は以下のとおりである。

1. CWD の病原体の可塑性に関する不確定性及びノルウェーで分離された株の伝達性に関するデータの欠如を考慮しても、本科学的意見書は、CWD による人獣共通感染症のリスクは極めて低いと考える。
2. 人の健康への影響は、サーベイランスの結果やプリオン株の特徴の同定を踏まえて継続的に評価される必要がある。人獣共通感染症の可能性について示すあらゆる研究を検討する必要がある。
3. 死亡したシカ科動物又は CWD の症状を示す動物は、所管当局及び訓練を受けた職員によって取り扱われることから、狩猟者や獣肉処理施設の職員へのリスクは無視できる。しかしながら、情報は適切な言語によって周知される必要がある。
4. 健康な動物の肉のみが、人の消費に適すとされていることから、CWD 感染動物の消費に関連したリスクは極めて低い。本件は、2016 年以前の猟期に収穫された肉についても適用される。
5. ベリー類、その他の植物又は土壌を介した人の健康へのリスクは無視できると考えられる。

上記 Phase I の結論に関し、Phase II では、以下のとおり見直しを行っている。

○トナカイについては、人獣共通感染症の可能性や食品安全の問題に関する評価に関連した新たな情報はない。したがって、上記の 1、2 及び 5 は依然として妥当

[‡] 頭部の剥製

である。

- シカ科動物は、症状を示す数か月前から CWD の病原体を保有・排出していることから、上記の 3 及び 4 について、無症状であるからといって人へのばく露を排除できるわけではないことを強調する。
- ヘラジカについては、ヘラジカ症例及びその病原体の特徴の同定に関する予備試験の結果から、トナカイや北米のシカ科動物で確認されたものと有意に異なるという重要な特徴が明らかとなった。このことは、人獣共通感染症の可能性について、従来型の CWD とは異なる可能性があるという不確定性を生じる。現段階の知見からは、食品安全に関する確固たる結論に至ることはできない。予防原理によって潜在的なリスクが減少される。

結論は以下のとおりである。

- 現段階の証拠及び人獣共通感染症の可能性に関する不確定性の程度を踏まえると、フードチェーンのみならず、その他の直接又は間接的なばく露源を介したのものも含め、人へのばく露リスクを最小化するための、積極的かつ予防的な措置が重要である。
- 人へのばく露を防止するための最も重要な措置は、シカ科動物における CWD の有病率を減少させること、望ましくは、風土病となる前に疾病を根絶することである。

さらに、CWD のカニクイザルへの伝達に関し得られた新たな知見（Czub らによる報告）について、update statement では、以下の見解を示している。

- Czub らによる実験経過報告では、プリオン病では、病気の伝達に関する種間バリアは、あったとしても、おおよそ絶対的なものではないことが強調されている。不完全な種間バリアに関連する不確定性については、人獣共通感染症の可能性は極めて低いと結論した以前の VKM の 2 つの意見書でも慎重に評価がなされた。
- 高感度の検査法で検査されない限りは、無症状期であっても CWD の感染性はトナカイの筋系に存在すると考えるべきである。したがって、頭部や脊髄の除去は、人へのばく露を減じるための措置としては、他のプリオン病に比べ、CWD プリオンでは効果的でないかもしれない。
- CWD 陽性の無症状の WTD に由来する肉を経口投与された結果、カニクイザルが CWD に感受性を示したということは、人へのばく露を減じるための予防的かつ優先した措置の必要性を増強する。現段階の知見では、CWD プリオンが人の病気の原因となる可能性は排除できない。しかし、そのリスクは極めて低いと思われる。
- 結論として、CWD の人獣共通感染症のリスクは、我々の以前の評価と同様、依然として極めて低いと考えられる。

(2) ノルウェー食品安全庁 (NFSA) ⁶²⁾

NFSA は、2016 年 9 月に公表した「CWD に関する狩猟者への情報」で、人への影

響に関して、以下の見解を示している。

CWD は人への感染リスクが極めて低い動物の疾病である。最近の国立獣医研究所の分析によると、ノルウェーにおける CWD は 2 タイプある可能性がある。ノルウェー公衆衛生研究所及び国立獣医研究所の助言を受けて、我々は現在、検査陽性動物への予防的アプローチを採用している。本病が人へ感染するリスクは極めて低いが、安全側に立ち、検査陽性動物の肉はフードチェーンに入っていない。

検査陽性動物を所有する狩猟者は、その肉や残さを処分するため、NFSA から連絡を受けることになっている。したがって、該当者は検査結果が出るまで肉を保管し、配布しないようにされたい。

5. 欧州連合（EU）⁶³⁾

欧州食品安全機関（EFSA）は、2019 年 11 月に公表した科学的意見書で、人への影響に関して、以下の見解を示している。なお、この意見書は 2017 年に公表した科学的意見書の見解を更新したものである。内容は以下のとおりである。

○北米で分離された CWD プリオンが、*in vitro* でヒト PrP を PrP^{Sc} に変換することやリスザルに伝達することを多くの研究が示している。しかし、ヒト PrP 発現マウス及びマカク属のサルを用いた *in vivo* の研究が、ヒトの感受性の最も適切なモデルであると考えられる。これらのモデルでは、北米で分離された CWD プリオンの伝達性について相反する知見が存在する。

○疫学的研究は多くの制約があり、また、北米で実施されているいくつかの研究は、依然進行中である。しかし、北米の CWD がヒトの病気の原因となったことを示す疫学的知見は現時点で無い。

○現段階では、入手可能なデータから北米で分離された CWD プリオンが人獣共通感染症を引き起こす可能性について結論を出すことはできない。また、欧州で分離された CWD プリオンが人獣共通感染症を引き起こす可能性を判断するためのデータは無い。

○CWD に感染したシカ科動物由来の肉、肉製品及び内臓の消費を通じたヒトへのリスクを直接的に評価することはできない。個人のレベルでは、CWD に感染したシカ科動物由来の肉、肉製品及び内臓を食べれば、CWD 病原体にばく露される。集団のレベルでは、シカ肉の消費を介したばく露の可能性は、消費されている各種シカ科動物（トナカイ、ヘラジカ及びアカシカ）における CWD の有病率に依存しており、その有病率は不明である。

○消費前に動物を検査すること、消費向けの動物から高リスク部位を除去すること又はこれら両方の措置を講じることは、CWD 病原体の食品を介したヒトへのばく露の可能性を減少させる。また、感染地域において感受性動物の狩猟を禁止することも予防的な措置となり得ると考えられる。

6. フィンランド¹³⁾

フィンランド食品局は、ウェブサイト上で、「CWD がヒトに感染することは知られて

おらず、したがって、ヒトへの実際的なリスクとは考えられない。」との見解を示している。

7. スウェーデン¹⁴⁾

スウェーデン国立獣医学研究所（SVA）は、ウェブサイト上で、「CWD がヒトに感染するリスクは、非常に低いと判断されるが、完全には否定できない。したがって、CWD 感染が確認された動物を食すことは推奨されない。」との見解を示している。

<参考文献>

1. 米国農務省 (USDA)
<https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/nvap/NVAP-Reference-Guide/Control-and-Eradication/Chronic-Wasting-Disease>
2. Stokstad E, Norway seeks to stamp out prion disease, *Science*, 2017; 356(6333), 12-13
3. Chronic Wasting Disease Alliance
<http://cwg-info.org/>
4. 米国地質研究所 (USGS)
https://www.usgs.gov/centers/nwhc/science/expanding-distribution-chronic-wasting-disease?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
5. 米国疾病管理予防センター (CDC)
<https://www.cdc.gov/prions/cwd/index.html>
6. カナダ食品検査庁 (CFIA)
<http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/cwd/eng/1330143462380/1330143991594>
7. Kahn S, Dubé C, Bates L, Balachandran A, Chronic wasting disease in Canada: Part 1, *Can Vet J*, 2004; 45(5), 397-404.
8. Green KM, Castilla J, Seward TS, Napier DL, Jewell JE, Soto C, Telling GC, Accelerated high fidelity prion amplification within and across prion species barriers. *Plos Pathog*, 2008; 4(8), e1000139
9. Kim TY, Shon HJ, Joo YS, Mun UK, Kang KS, Lee YS, Additional Cases of Chronic Wasting Disease in Imported Deer in Korea, *J Vet Med Sci*, 2005; 67(8), 753-759
10. 韓国農林畜産部動物防疫統合システム (KAHIS)
<http://www.kahis.go.kr/home/lkntscriinfo/selectLkntsOccrrncList.do?openFlag=Y>
11. ノルウェー国立獣医学研究所 (NVI)
<https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease>
12. ノルウェー国立獣医学研究所 (NVI)
<https://www.vetinst.no/en/news/cwd-in-finland-is-different-from-the-nordfjella-cwd-type>
13. フィンランド食品安全庁 (EVIRA)
https://www.evira.fi/en/animals/current_issues/2018/moose-found-dead-in-forest-with-chronic-wasting-disease/
14. スウェーデン国立獣医学研究所 (SVA)
<https://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/avmagringssjuka-cwd-upptackt-pa-avg-i-norrbottnens-lan>
15. 農林水産省、伝達性海綿状脳症(TSE)検査対応マニュアル、平成 15 年 6 月 17 日付 15 生畜第 1337 号、農林水産省生産局畜産部長通知、2003
16. Masujin K, Shimada K, Kimura KM, Imamura M, Yoshida A, Iwamaru Y, Mohri S, Yokoyama T, Applicability of current bovine spongiform encephalopathy (BSE) diagnostic procedures for chronic wasting disease (CWD), *Microbiol Immunol*, 2007; 51, 1039-1043
17. 横山隆、辻知香、横山真弓、ニホンジカのプリオン病 (CWD) サーベイランス、*JVM*, 2012; 65(6), 479-481
18. 農林水産省、野生動物におけるサーベイランス、平成 30 年度
http://www.maff.go.jp/j/syoutan/douei/katiku_yobo/wildlife_surveillance.html
19. Jewell JE, Brown J, Kreeger T, Williams ES, Prion protein in cardiac muscle of elk (*Cervus elaphus nelsoni*) and white-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) infected with chronic wasting disease, *J. Gen. Virol*, 2006; 87, 3443-3450
20. Angers RC, Browning SR, Seward TS, Sigurdson CJ, Miller MW, Hoover EA, Telling GC, Prions in skeletal muscles of deer with chronic wasting disease, *Science*, 2006; 311(5764), 1117
21. Daus ML, Breyer J, Wagenfuehr K, Wemheuer WM, Thomzig A, Schulz-Schaeffer WJ, Beekes M, Presence and seeding activity of pathological prion protein (PrP^{TSE}) in skeletal muscles of white-tailed deer infected with chronic wasting disease, *PLoS One*, 2011; 10(1), e0116094

22. Mathiason CK, Powers JG, Dahmes SJ, Osborn DA, Miller KV, Warren RJ, Mason GL, Hays SA, Hayes-Klug J, Seelig DM, Wild MA, Wolfe LL, Spraker TR, Miller MW, Sigurdson CJ, Telling GC, Hoover EA, Infectious prions in the saliva and blood of deer with chronic wasting disease, *Science*, 2006; 314(5796), 133-136
23. Sigurdson CJ, Spraker TR, Miller MW, Oesch B, Hoover EA, PrP(CWD) in the myenteric plexus, vagosympathetic trunk and endocrine glands of deer with chronic wasting disease, *J Gen Virol*, 2001; 82(10), 2327-2334
24. Belay ED, Gambetti P, Schonberger LB, Parchi P, Lyon DR, Capellari S, McQuiston JH, Bradley K, Dowdle G, Crutcher JM, Nichols CR, Creutzfeldt-Jakob disease in unusually young patients who consumed venison, *Arch Neurol*, 2001; 58(10), 1673-1678
25. Centers for Disease Control and Prevention, Fatal Degenerative Neurologic Illnesses in Men Who Participated in Wild Game Feasts—Wisconsin, 2002, *MMWR*, 2003; 52, 125-127
26. Belay ED, Maddox RA, Williams ES, Miller MW, Gambetti P, Schonberger LB, Chronic Wasting Disease and Potential Transmission to Humans, *Emerg Infect Dis*, 2004; 10(6), 977-984
27. Anderson CA, Bosque P, Filley CM, Arciniegas DB, Kleinschmidt-Demasters BK, Pape WJ, Tyler KL, Colorado surveillance program for chronic wasting disease transmission to humans: lessons from 2 highly suspicious but negative cases, *Arch Neurol*, 2007; 64(3), 439-441
28. Mawhinney S, Pape WJ, Forster JE, Anderson CA, Bosque P, Miller MW, Human Prion Disease and Relative Risk Associated with Chronic Wasting Disease, *Emerg Infect Dis*, 2006; 12(10), 1527-1535
29. Garruto RM, Reiber C, Alfonso MP, Gastrich H, Needham K, Sunderman S, Walker S, Weeks J, Derosa N, Faisst E, Dunn J, Fanelli K, Shilkret K, Risk behaviors in a rural community with a known point-source exposure to chronic wasting disease, *Environ Health*, 2008; 7, 31-37
30. Olszowy KM, Lavelle J, Rachfal K, Hempstead S, Drouin K, Darcy JM, Reiber C, Garruto RM, Six-year follow-up of a point-source exposure to CWD contaminated venison in an Upstate New York community: risk behaviours and health outcomes 2005-2011, *Public Health*, 2014; 128(9), 860-868
31. Marsh RF, Kincaid AE, Bessen RA, Bartz JC, Interspecies transmission of chronic wasting disease prions to squirrel monkeys (*Saimiri sciureus*), *J Virol*, 2005; 79(21), 13794-13796
32. Race B, Meade-White KD, Miller MW, Barbian KD, Rubenstein R, LaFauci G, Cervenakova L, Favara C, Gardner D, Long D, Parnell M, Striebel J, Priola SA, Ward A, Williams ES, Race R, Chesebro B, Susceptibilities of Nonhuman Primates to Chronic Wasting Disease, *Emerg Infect Dis*, 2009; 15(9), 1366-1376
33. Race B, Meade-White KD, Phillips K, Striebel J, Race R, Chesebro B, Chronic wasting disease agents in nonhuman primates, *Emerg Infect Dis*, 2014; 20(5), 833-837
34. Race B, Williams K, Orrú CD, Hughson AG, Lubke L, Chesebro B, Lack of Transmission of Chronic Wasting Disease to *Cynomolgus* Macaques, *J Virol*, 2018; Apr 25. pii: JVI.00550-18.
35. Comoy EE, Mikol J, Luccantoni-Freire S, Correia E, Lescoutra-Etcheagaray N, Durand V, Dehen C, Andreoletti O, Casalone C, Richt JA, Greenlee JJ, Baron T, Benestad SL, Brown P, Deslys JP, Transmission of scrapie prions to primate after an extended silent incubation period, *Sci Rep*, 2015; 5, 11573-11583
36. Kong Q, Huang S, Zou W, Vanegas D, Wang M, Wu D, Yuan J, Zheng M, Bai H, Deng H, Chen K, Jenny AL, O'Rourke K, Belay ED, Schonberger LB, Petersen RB, Sy MS, Chen SG, Gambetti P, Chronic wasting disease of elk: transmissibility to humans examined by transgenic mouse models, *J Neurosci*, 2005; 25(35), 7944-7949
37. Tamguney G, Giles K, Bouzamondo-Bernstein E, Bosque PJ, Miller MW, Safar J, DeArmond SJ, Prusiner SB, Transmission of elk and deer prions to transgenic mice, *J Virol*, 2006; 80(18), 9104-9114
38. Sandberg MK, Al-Doujaily H, Sigurdson CJ, Glatzel M, O'Malley C, Powell C, Asante EA, Linehan JM, Brandner S, Wadsworth JD, Collinge J, Chronic wasting disease prions are not transmissible to transgenic mice overexpressing human prion protein, *J Gen Virol*,

- 内閣府
2010; 91(10), 2651-2657
39. Wilson R, Plinston C, Hunter N, Casalone C, Corona C, Tagliavini F, Suardi S, Ruggerone M, Moda F, Graziano S, Sbriccoli M, Cardone F, Pocchiari M, Ingrosso L, Baron T, Richt J, Andreoletti O, Simmons M, Lockey R, Manson JC, Barron RM, Chronic Wasting Disease and Atypical forms of bovine spongiform encephalopathy and scrapie are not transmissible to mice expressing wild-type levels of human prion protein, *J Gen Virol*, 2012; 93, 1624-1629
 40. Kurt TD, Jiang L, Fernández-Borges N, Bett C, Liu J, Yang T, Spraker TR, Castilla J, Eisenberg D, Kong Q, Sigurdson CJ, Human prion protein sequence elements impede cross-species chronic wasting disease transmission, *J Clin Invest*, 2015; 125(4), 1485-1496
 41. Race B, Williams K, Chesebro B, Transmission studies of chronic wasting disease to transgenic mice overexpressing human prion protein using the RT-QuIC assay, *Vet Res*, 2019; 50(6)
 42. Haley NJ, Richt JA, Evolution of Diagnostic Tests for Chronic Wasting Disease, a Naturally Occurring Prion Disease of Cervids, *Pathogens*, 2017; 6(3), 35-56
 43. Kurt TD, Sigurdson CJ, Cross-species transmission of CWD prions, *Prion*, 2016; 10(1), 83-91
 44. Gould DH, Voss JL, Miller MW, Bachand AM, Cummings BA, Frank AA, Survey of cattle in northeast Colorado for evidence of chronic wasting disease: geographical and high-risk targeted sample, *J Vet Diagn Invest*, 2003; 15(3), 274-277
 45. Hamir AN, Cutlip RC, Miller JM, Williams ES, Stack MJ, Miller MW, O'Rourke KI, Chaplin MJ, Preliminary findings on the experimental transmission of chronic wasting disease agent of mule deer to cattle, *J Vet Diagn Invest*, 2001; 13(1), 91-96
 46. Hamir AN, Kunkle RA, Cutlip RC, Miller JM, O'Rourke KI, Williams ES, Miller MW, Stack MJ, Chaplin MJ, Richt JA, Experimental transmission of chronic wasting disease agent from mule deer to cattle by the intracerebral route, *J Vet Diagn Invest*, 2005; 17(3), 276-281
 47. Hamir AN, Miller JM, Kunkle RA, Hall SM, Richt JA, Susceptibility of cattle to first-passage intracerebral inoculation with chronic wasting disease agent from white-tailed deer, *Vet Pathol*, 2007; 44(4), 487-493
 48. Greenlee JJ, Nicholson EM, Smith JD, Kunkle RA, Hamir AN, Susceptibility of cattle to the agent of chronic wasting disease from elk after intracranial inoculation, *J Vet Diagn Invest*, 2012; 24(6), 1087-1093
 49. Williams ES, O'Toole D, Miller MW, Kreeger TJ, Jewell JE, Cattle (*Bos taurus*) Resist Chronic Wasting Disease Following Oral Inoculation Challenge or Ten Years' Natural Exposure in Contaminated Environments, *J Wildl Dis*, 2018; 54(3), 000-000
 50. 農林水産省、米国及びカナダから日本向けに輸出される鹿等の家畜衛生条件の停止について、平成 13 年 10 月 26 日付 13 生畜第 3957 号、農林水産省生産局畜産部衛生課長通知、2001
 51. 農林水産省、韓国から日本向けに輸出されるシカ科動物及び同科動物由来の畜産物等の取扱いについて、平成 14 年 10 月 2 日付 14 生畜第 4588 号、農林水産省生産局畜産部衛生課長通知、2002
 52. 農林水産省、ノルウェーにおける鹿慢性消耗病(CWD)発生に伴う検疫対応について、平成 28 年 4 月 8 日付 28 消安第 149 号、農林水産省消費・安全局長通知、2017
 53. 農林水産省、フィンランドにおける鹿慢性消耗病 (CWD) 発生に伴う検疫対応について、平成 30 年 4 月 16 日付 30 消安第 397 号、農林水産省消費・安全局長通知、2018
 54. 農林水産省、スウェーデンにおける鹿慢性消耗病 (CWD) 発生に伴う検疫対応について、平成 31 年 4 月 5 日付 31 消安第 25 号、農林水産省消費・安全局長通知、2019
 55. 厚生労働省、輸入鹿肉等の取扱いについて、平成 14 年 10 月 2 日付食監発第 1002002 号、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長通知、2002
 56. 厚生労働省、輸入鹿肉等の取扱いについて、平成 28 年 4 月 8 日付生食輸発 0408 第 1 号、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長通知、2016
 57. 厚生労働省、輸入鹿肉等の取扱いについて、平成 30 年 4 月 13 日付薬生食輸発 0413 第 3 号、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室長通知、2018
 58. 厚生労働省、輸入鹿肉等の取扱いについて、平成 31 年 4 月 5 日付薬生食輸発 0405 第 1 号、厚

生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室長通知、2019

59. ノルウェー食品安全科学委員会(VKM), CWD in Norway, Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, VKM Report 2016: 26, 978-82-8259-216-1
60. ノルウェー食品安全科学委員会(VKM), CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II), Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, VKM Report 2017: 9, 978-82-8259-266-6
61. ノルウェー食品安全科学委員会(VKM), CWD – update statement, Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, VKM Report 2017: 26, 978-82-8259-283-3
62. ノルウェー食品安全庁(NFSA)
https://www.mattilsynet.no/language/english/animals/information_for_hunters_about_chronic_wasting_disease_cwd.23747
63. 欧州食品安全機関(EFSA), Update on chronic wasting disease (CWD) III, EFSA Journal, 2019; 17(11), 5863

参考文献の URL は、令和元年(2019年)11月12日時点で確認したものです。情報を掲載している各機関の都合により、URL が変更される場合がありますのでご注意ください。